

BLÅMEIS

(*Cyanistes caeruleus*) er en fugl i meisefamilien. Den er ca 12 cm lang og veier omtrent 11 gram. Den er lett å kjenne igjen på blåfargen på hodet og den svarte stripen gjennom øyet. Den er i likhet med kjøttmeisen en sosial fugl, og trives gjerne sammen med denne. Henger du opp en fuglekasse, kan du gjerne være heldig og få besøk av en blåmeisfamilie, for de vil gjerne bo der. Blåmeisen finnes nord til Narvik.



BOKFINK

(*Fringilla coelebs*) er en fugl i finkefamilien. Den er ca 15 cm lang. Hannen har gråblå hette,, kastanjebrun rygg og rødbrun underside, mens hunnen er ganske ensfarget gråbrun. Begge har svarte og hvite tegninger på vingene. Den er vanlig i hele Norge nord til Troms, og det finnes også noen bokfinker i de mildeste delene av Finnmark. Om vinteren trekker den sørover i Europa for å overvintre, men noen klarer seg langs norskekysten. Bokfinken plasserer ofte reiret sitt i en grenkløft der den legger 4-5 egg. Hunnen ruger på eggene i 12-13 dager.



FLAGGSPETT

(*Dendrocopos major*) er den vanligste spettefuglen i Europa. I Norge har den vært vanligst på Øst- og Sørlandet, men i de senere årene har flaggspetten funnet veien også nordover helt til Finnmark. Den spiser insekter om sommeren og frø om vinteren. Det er lett å høre flaggspetten, den lager en trommevirvel på trestammer eller på andre harde underlag. Fjærdrakten er hvit og svart med røde detaljer på magen, hannen er også rød i nakken.



GRANMEIS

Granmeis (*Parus montanus*) er en fugl i meisefamilien. Den er litt mindre enn kjøttmeisen, ca 12 cm lang og 11 gram. Den har svart hette og strupe, lyse kinn, og hvite striper på vingene. Granmeisen er en standfugl som trives i hele Norge, først og fremst i bar- og blandingsskog. Den spiser insekter, larver og edderkopper om sommeren, frø om vinteren. Om høsten hamstrer den frø som den gjemmer under lav på trærne. Granmeisen trives i fuglekasser, eller den bygger reir i gamle, hule trær eller morkne stubber. Den legger 7–9 egg som klekkes etter 12–15 dager.



KJØTTMEIS

(Parus Major) er en fugl i meisefamilien. Den finnes i hele landet, og har mange navn, som for eksempel tertitt og talgokse. Kjøttmeisa er omtrent 15 cm lang og veier 14–20 gram. Det er den største av meise-fuglene.

Kjøttmeisens mat er insekter, frø, bær og mark. Om vinteren er det mest frø, men i hekkesesongen liker den best insekter. Den hamstrer ikke mat, og derfor er den en vanlig fugl på fuglebrettet om vinteren. Den trives sammen med andre fugler, men i hekketiden blir hannerne ganske aggressive. Den hekker fra april til juli, og får ofte to kull i året. Ungene forlater redet etter 15-20 dager.



LØVSANGER

Løvsangeren (*Phylloscopus trochilus*) er en fugl i sangerfamilien, og den fuglen det finnes flest av i hele Norge! Den trives over hele landet fra skjærgården til snaufjellet. Den er liten med grågrønne fjær, mer gråhvit på undersiden. Den veier bare 7–11 gram. Løvsangeren bygger reiret sitt på bakken. Den legger 6–8 egg som klekkes etter 13 døgn. 13–14 døgn senere forlater ungene reiret. Løvsangeren er en trekkfugl, og mange av dem overvintrer i det nordvestlige Afrika.



RØDSTRUPE

Rødstrupe (*Erithacus rubecula*) er en fugl i fluesnapperfamilien. Den er omtrent like stor som en kjøttmeis, og veier 16–22 gram. Hannen og hunnen er lik, med rustrød panne, strupe og bryst og gråbrun rygg. Den er vanlig i hele Norge nord til Troms. Den legger 6–7 egg som ruges i 12–14 dager. Rødstrupe er en trekkfugl. De fleste flyr til Sørvest-Europa og landene rundt Middelhavet for å overvin- tre, men noen overvintrer langs kysten i Sør-Norge.



SVARTHVIT FLUESNAPPER

(*Ficedula hypoleuca*) er en fugl i fluesnapperfamilien. Hannfuglen er svart og hvit, hunnen er gråbrun og gulhvit. Den lever av insekter, særlig fluer og mygg. Den trives i skog, hager og parker over hele landet. Den er en trekkfugl, og overvintrer i Vest-Afrika. Om våren kommer hannen først, en uke før hunnen, for å lete etter reirplass. Men det er ikke så lett, for mange plasser er allerede opptatt av konkurrerende arter som meiser og stær. Derfor hjelper vi fluesnapperen ved å lage fuglekasser. Eggene til fluesnapperen har en fin, lyseblå farge. Hunnen legger 5-7 egg i slutten av mai. Etter et par ukers ruging klekkes eggene, og etter nye to uker forlater ungene reiret.



SVARTSPETT

(*Dryocopus martius*) er en spettefugl som også kalles for gjertruds-fugl. Den trives i gammel skog og er lett å kjenne igjen på den svarte drakten og den røde toppen. Den blir 50–55 cm lang og veier omtrent 300 gram. Den hakker ut reirhull i trær, og slike hull blir ofte en halv meter dype eller mer. Det kan ta en måned å hakke ut reiret. Svartspetten lever for det meste av insekter som lever i døde trær. Svartspetten er vanligst på Øst- og Sørlandet og noen steder i Midt-Norge, men ellers sjelden. Den er en standfugl. Det betyr at den ikke reiser sørover om vinteren.



SVARTTROST

(*Turdus merula*) er en fugl i trostefamilien. Den kalles også blant annet susvarta, svinsvort, svartstare og steintrast. Hannen er helt svart med gult nebb, hunnen er mørkebrun. Den lever i skog- og bystrøk i hele Norge. I utgangspunktet er den en trekkfugl, men den kan også overvintre i store deler av landet. Den liker å plassere reiret sitt i en busk eller et lavt tre, eller på en hylle i en mur eller bergvegg. Svarttrosten spiser for det meste meitemark, men liker også snegler, bær, edderkopper, frukt og insekter. Den legger 4–6 blågrønne egg med rødbrune flekker. Svarttrosten er kjent for den vakre sangen sin.

